

CONSIGLI PER LA SALUTE ORALE NEL BAMBINO CARDIOPATICO

Capurro C, Telini G, Ceccarelli G, Laffi N.

- I bambini affetti da cardiopatia congenita sono in continuo aumento grazie all'evoluzione delle cure.
- La patologia stessa ed alcuni dei medicinali a loro somministrati aumentano il rischio di patologie orali.
- I bambini cardiopatici sono soggetti a maggiore incidenza di carie e di denti mal posizionati.

LA CURA DEL CAVO ORALE EVITA COMPLICANZE DELLA CARDIOPATIA LA CARDIOPATIA NON È UNA CONTROINDICAZIONE ALLE CURE ODONTOIATRICHE



Le famiglie dei cardiopatici

- non pongono attenzione alla salute orale, poiché sottoposti a frequenti visite e ricoveri che distolgono l'attenzione dalla cura della bocca.
- non ricevono informazioni riguardo la correlazione tra bocca e cuore

Ad oggi molti odontoiatri demandano alle strutture ospedaliere la cura dei bambini cardiopatici, non sapendo con quali modalità operative erogare le terapie odontoiatriche di prevenzione e cura.



I bambini cardiopatici richiedono particolari attenzioni orali per il rischio di endocardite batterica

- E' fondamentale instaurare un **piano individualizzato** di prevenzione delle patologie orali nei bambini cardiopatici al momento della diagnosi di cardiopatia.
- Pediatri e cardiologi devono saper fornire principi di prevenzione delle patologie orali
- Gli odontoiatri sul territorio devono conoscere le corrette modalità di presa in carico e cura in modo da garantire cure tempestive e adeguate.

Odontoiatri e cardiologi dell'ospedale pediatrico Gaslini hanno predisposto una **BROCHURE INFORMATIVA**

rivolta a famiglie, pediatri e colleghi odontoiatri per fornire informazioni sulla prevenzione e la possibilità di cure odontoiatriche ambulatoriali nei bambini cardiopatici.

INDICAZIONI PER GLI ODONTOIATRI

- Prima visita e terapie non invasive in studio/ambulatorio.
- Instaurare un protocollo di prevenzione.
- Contattare il cardiologo prima di cure invasive.
- Eeguire sedute di igiene.
- Sigillare i molari permanenti.
- Applicare vernici al fluoro.
- Terapie Canalari solo sui denti a valore estetico.
- Conservativa sui decidui delle sole lesioni senza coinvolgimento pulpare.
- Differire a struttura ospedaliera sulla base delle informazioni del cardiologo.
- Se necessaria e fattibile AL con vasocostrittore 1:100.000 MASSIMO 2 tubofiale.
- Controllo dell'ansia.

FARMACI CARDIOLOGICI RISCHIOSI PER I DENTI

Captopril in formato liquido
 → sciacqui dopo ogni assunzione con acqua e bicarbonato.

Digossina in formato liquido
 → lava subito i denti con spazzolino e dentifricio al fluoro.

Farmaci cardiologici liquidi
 → accertati dal tuo farmacista che la preparazione sia senza zucchero (richiedi base tipo SyrSpend SF).

COME CURARE LA BOCCA DEL TUO BAMBINO

Programma subito la visita dal dentista entro i 12 mesi

NEONATO-LATTANTE:

Pulire il cavo orale dopo ogni poppata e dopo ogni assunzione di terapia con garza e fisiologica.

BAMBINO:

Spazzolare i denti dopo ogni pasto e assunzione di terapia con dentifricio al fluoro:

↓
 minore di 6 anni almeno 1000 ppm
 maggiore di 6 anni 1400 1450 ppm

Bevi solo acqua!

Scegli come merenda alimenti tipo grana o noci!



BIBLIOGRAFIA

Hughes S, Balmer R, Moffat M, Willcoxson F. The dental management of children with congenital heart disease following the publication of Paediatric Congenital Heart Disease Standards and Specifications. Br Dent J. 2019 Mar;226(6):447-452
 FitzGerald K., Fleming P., Franklin O. Dental health and management for children with congenital heart disease - Primary Dental Care 2010;17(1):21-25
 Itamará L, Itagiba N. Safety of Local Dental Anesthesia in Patients With Cardiac Channelopathies. 2018 Nov; ClinicalTrials.gov Identifier:
 Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia 2017. Indicazioni per la presa in carico del paziente con bisogni speciali che necessita di cure odontostomatologiche. 2019. Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva. 2013. Raccomandazioni per la promozione della salute orale in età perinatale 2014